Mode d'emploi du médicament Daflon

Dans quel cas le médicament DAFLON est-il prescrit ?

C'est un veinotonique et un protecteur vasculaire. Il stimule la circulation du sang dans les veines et lutte contre l'altération des vaisseaux capillaires.
Il est utilisé dans le traitement symptomatique :

- des jambes lourdes, impatiences et autres troubles en rapport avec une mauvaise circulation veineuse ou lymphatique ;
- des crises d'hémorroïdes.

Présentations du médicament DAFLON

DAFLON 500 mg : comprimé (saumon) ; boîte de 60

Composition du médicament DAFLON

	p cp	p cp
Flavonoïdes, extraits de rutacées (aurantiées)	375 mg	
Fractions flavonoïques purifiées		500 mg
soit Diosmine	150 mg	450 mg
soit Hespéridine	150 mg	50 mg

Substance active : Flavonoïdes
Excipients communs : Talc, Titane dioxyde
Autres excipients (spécifiques à certaines formes) : Bicarbonate de sodium, Carmellose sodique, Cellulose microcristalline, Fer jaune oxyde, Fer rouge oxyde, Gélatine, Glycérol, Hypromellose, Lactose, Macrogol 6000, Magnésium stéarate, Paraffine liquide, Polysorbate 80, Povidone, Saccharose, Silice colloïdale, Sodium carboxyméthylamidon, Sodium laurylsulfate

Attention

Ce médicament est insuffisant pour prévenir le risque de phlébite chez les malades alités ou plâtrés. Le traitement de l'insuffisance veineuse repose sur des mesures spécifiques telles que le port de bas de contention.
Des douleurs, un saignement anal qui persistent malgré le traitement peuvent être dus à une maladie autre que des hémorroïdes et nécessitent un avis médical. De même, tout saignement anal survenant chez une personne de plus de 50 ans doit faire l'objet d'une consultation médicale.

Fertilité, grossesse et allaitement

L'effet de ce médicament pendant la grossesse ou l'allaitement est mal connu. L'évaluation du risque éventuel lié à son utilisation est individuelle : demandez conseil à votre pharmacien ou à votre médecin.

Mode d'emploi et posologie du médicament DAFLON

Ce médicament doit être pris avec un verre d'eau au cours des repas.
Posologie usuelle :
1 comprimé à 500 mg, midi et soir.
Traitement des hémorroïdes : 8 à 12 comprimés à 375 mg ou 4 à 6 comprimés à 500 mg par jour.

Conseils

Une activité physique régulière et la surélévation du pied du lit permettent de faciliter la circulation veineuse et lymphatique.
La constipation chronique et les efforts excessifs de poussée sont les principaux facteurs déclenchant des crises d'hémorroïdes. Un régime riche en fibres alimentaires, des boissons abondantes et un exercice physique régulier en limitent le risque.

Effets indésirables possibles du médicament DAFLON
Rarement : troubles digestifs.

Merci de nous contacter pour toute demande ou interrogation.

Pharmacie Paget
2 rue Pasteur
81990 Puygouzon

Tél 05.63.54.11.02
Fax 05.63.38.96.10
pharmacie.paget@yahoo.fr

Votre santé, notre priorité

Si vos symptômes persistent, contactez votre médecin.